


Descompresión subacromial



Descripción general

Esta cirugía trata un pinzamiento subacromial. Ese es un dolor que usted siente cuando levanta el brazo. Se produce cuando los tendones de su hombro presionan y rozan contra una parte de la escápula llamada el "acromion". Esta cirugía comúnmente se realiza con la ayuda de una cámara especial llamada "artroscopio".

Preparación

Para empezar, se le administra un medicamento para que se sienta adormecido y relajado o que lo ponga a dormir. Se hacen unas pequeñas aberturas en su piel. Su cirujano coloca el artroscopio en una de ellas. Se pueden colocar pequeños instrumentos en las otras.

Procedimiento

Con la ayuda del artroscopio, su cirujano inspecciona la articulación. Le vuelve a dar forma a su acromión. Esto le da más espacio a sus tendones. Los tejidos dañados se eliminan o se reparan. Algunas veces, su cirujano necesita hacer una incisión más grande durante la operación.

Fin del procedimiento y cuidados postoperatorios

Cuando la cirugía se ha completado, se cierran las aberturas de su piel. Se le mantiene en observación durante un tiempo breve mientras despierta, y luego puede regresar a casa. Puede usar un cabestrillo durante unos días mientras se recupera. Su proveedor de atención médica le dará algunos consejos para ayudar a su recuperación.