



Mira el video

Corrección de juanete de sastre (osteotomía distal del quinto metatarsiano)



Descripción general

Este procedimiento quirúrgico es realizado para corregir un juanetillo, una protuberancia ósea también conocida como juanete de sastre, que se desarrolla en el lado externo del pie en la base del quinto dedo (dedo pequeño). Durante este procedimiento, el cirujano realinea la cabeza del metatarsiano y quita el exceso de hueso para eliminar la protuberancia y darle al pie una forma más natural.

Preparación

Como preparación para el procedimiento, el paciente es colocado en posición y luego se le administra anestesia. El cirujano crea una pequeña incisión a lo largo de la parte externa del pie para obtener acceso a la articulación metatarso-falángica, donde la falange del dedo se encuentra con la cabeza del metatarsiano. El juanetillo se encuentra ubicado en la cabeza del metatarsiano.



Realineando el dedo

El cirujano usa un instrumento de corte para extraer el exceso de hueso del metatarsiano. Luego corta cuidadosamente el metatarsiano, liberando la cabeza de este hueso, la cual es desplazada hacia adentro, apartándola del lado externo del pie, reduciendo el ancho del mismo y brindándole una base más estable al quinto dedo. El cirujano introduce un tornillo a través de la cabeza del metatarsiano, sujetándolo en su sitio.

Fin del procedimiento y cuidados postoperatorios

Cuando el procedimiento ha terminado, se cierra la incisión y se vende el pie. Al paciente puede colocársele un calzado postoperatorio y permitírsele apoyar el pie. La mayoría de los pacientes se recuperarán de seis a ocho semanas.

