



Lesión cerebral traumática (LCT)



Descripción general

Esta es una lesión que daña su cerebro. El resultado de la misma es una disfunción cerebral. Puede afectar severamente su vida.

Causas

Una LCT puede ser el resultado de un golpe violento contra su cabeza. Tal impacto puede hacer que su cerebro se estrelle contra su cráneo. Ello puede desgarrar tejidos y vasos sanguíneos. Puede producir una hemorragia dentro y alrededor de su cerebro. Una lesión cerebral traumática también puede ser causada por cualquier cosa que penetre en su cabeza y se introduzca en el cerebro. También puede producirla un fragmento de cráneo que se rompa y sea empujado hacia adentro de su cerebro. Caídas, accidentes vehiculares, lesiones deportivas y asaltos son las causas comunes de la LCT.

Síntomas

Los síntomas dependen de cuán gravemente se dañe su cerebro. Es posible que pierda temporalmente la consciencia. Es posible que experimente dolor de cabeza, confusión y problemas de visión. Es posible que le zumben los oídos. Puede ser que no pueda hablar claramente. Puede ser que tenga problemas de coordinación y de movimiento. Es posible que tenga problemas con la memoria y el pensamiento. Puede ser que tenga cambios emocionales. Sus síntomas pueden ser leves, moderados o graves.

Tratamiento

Entre las opciones de tratamiento se incluye la atención de emergencia para evitar mayores daños a su cerebro. Es posible que sean necesarios procedimientos quirúrgicos para corregir el daño a su cráneo y a los tejidos blandos. Es posible que se le coloque temporalmente en coma inducido, de modo de tratar esas lesiones. Puede ser que necesite medicamentos para controlar los fluidos y prevenir las convulsiones. A medida que usted se recupere de una LCT es posible que le resulten beneficiosas terapias para volver a aprender sus habilidades y retomar sus actividades diarias. Su proveedor de atención médica puede crear un plan de cuidados que sea el adecuado para sus necesidades.