





Mira el video

Neuralgia del trigémino



Descripción general

Esta condición crónica es causada por una falla del nervio trigémino. Un ataque causa episodios breves de dolor extremo y punzante.

Acerca del nervio trigémino

El nervio trigémino está formado por una raíz gruesa en la base del cerebro y tres ramas que se extienden hacia el rostro. Estas ramas son sensibles al tacto y controlan los músculos de la masticación.

Por qué se produce

La neuralgia del trigémino por lo general se produce cuando una arteria o vena comprime la raíz del nervio trigémino, causando una falla en su conducción nerviosa. El nervio también puede ser irritado por un tumor u otro trastorno.

Desencadenando un ataque

Los ataques de dolor a menudo son desencadenados por algún tipo de contacto con el rostro. Cepillarse los dientes, aplicarse maquillaje, afeitarse, comer, hablar, o estar expuesto al viento pueden desencadenar un episodio de dolor.

Síntomas

Un ataque de neuralgia del trigémino puede durar desde algunos segundos hasta unos minutos. La gente describe al dolor como una quemadura repentina o choque eléctrico, que típicamente se siente en un sólo lado del rostro. Es una sensación increíblemente intensa que puede incapacitar físicamente a la persona.

Tratamiento

Las opciones de tratamiento incluyen medicamentos, varios tipos de procedimientos quirúrgicos, y un procedimiento de radiología llamado radiocirugía estereotáctica (o bisturí de rayos Gamma).