


## Ligadura de trompas (esterilización laparoscópica de las trompas por medio de clips)




### Descripción general

Este procedimiento, llamado comúnmente "ligadura de trompas" se realiza para bloquear las trompas de Falopio a fin de impedir el embarazo. Se realiza con la ayuda de un telescopio con iluminación, llamado laparoscopio y normalmente toma 30 minutos en completarse.

### Preparación

Como preparación para el procedimiento, se coloca a la paciente en posición y se administra anestesia general. El médico realiza una o dos pequeñas incisiones en el abdomen para acceder a las trompas de Falopio. El médico infla cuidadosamente el abdomen con dióxido de carbono. Esto levanta la pared abdominal y separa a los órganos, creando espacio para que el médico pueda insertar el laparoscopio, y con seguridad acceder y visualizar los órganos pélvicos.



### Colocación de los clips

El médico utiliza instrumentos quirúrgicos para aislar la trompa de Falopio. Se inserta un pequeño clip con bisagra y se coloca alrededor de una pequeña sección de la trompa. El clip comprime y cierra firmemente la trompa, bloqueando el paso del esperma y de los óvulos. Se coloca un segundo clip en la otra trompa. Con el tiempo, los clips harán que las secciones comprimidas de las trompas cicatricen y que sus extremos se separen.

### Fin del procedimiento y cuidados post-operatorios

Cuando el procedimiento se ha completado, se retiran los instrumentos y se vendan las incisiones. Despues de un corto período de supervisión, la paciente podrá regresar a su casa. La mayoría de las pacientes pueden reintegrarse a su trabajo a los pocos días del procedimiento.

