


Ligadura de trompas (coagulación bipolar y laparoscópica de las trompas)




Descripción general

Este procedimiento, llamado comúnmente "ligadura de trompas" se realiza para bloquear las trompas de Falopio a fin de impedir el embarazo. Se realiza con la ayuda de un telescopio con iluminación, llamado laparoscopia y normalmente toma 30 minutos en completarse.

Preparación

Como preparación para el procedimiento, se coloca a la paciente en posición y se administra anestesia general. El médico realiza una o dos pequeñas incisiones en el abdomen para acceder a las trompas de Falopio. El médico infla cuidadosamente el abdomen con dióxido de carbono. Esto levanta la pared abdominal y separa a los órganos, creando espacio para que el médico pueda insertar el laparoscopio, y con seguridad acceder y visualizar los órganos pélvicos.



Tratamiento de las trompas

El médico aísla y toma con cuidado una sección pequeña de la trompa de Falopio con fórceps especiales que están conectados a una fuente de energía eléctrica. Se pasa una corriente eléctrica a través de los fórceps, lo cual crea una quemadura controlada que daña la trompa. Es posible que se trate a más de una sección de la trompa, a fin de asegurar el bloqueo de esperma y de óvulos. El proceso se repite en la otra trompa de Falopio. Con el tiempo, los extremos de las trompas cicatrizarán y es posible que se separen por completo.

Fin del procedimiento y cuidados post-operatorios

Cuando el procedimiento se ha completado, se retiran los instrumentos y se vendan las incisiones. Después de un corto período de supervisión, la paciente podrá regresar a su casa. La mayoría de las pacientes pueden reintegrarse a su trabajo a los pocos días del procedimiento.

