





Parálisis de las cuerdas vocales



Descripción general

Esta afección se produce como resultado de una interrupción de los impulsos nerviosos hacia la laringe. La parálisis de las cuerdas vocales puede afectar el lenguaje, permitir que los alimentos y líquidos entren en los pulmones y producir dificultades respiratorias.

Causas

La causa exacta de la parálisis de las cuerdas vocales a menudo se desconoce. Algunas causas pueden incluir lesiones de las cuerdas vocales durante una cirugía, traumatismo en el cuello, un accidente cerebrovascular, tumores y crecimientos, inflamación o infección y problemas neurológicos como el mal de Parkinson.

Síntomas

Los síntomas de la parálisis de las cuerdas vocales pueden incluir pérdida del tono o la fuerza vocal, sensación de un objeto atascado en la garganta, respiración ruidosa o fatigosa, tos y ahogamiento con alimentos y líquidos al tragar.

Tratamiento

Las opciones de tratamiento dependen de la causa subyacente. Algunos casos pueden requerir únicamente de terapia de la voz para fortalecer, estirar o entrenar de nuevo las cuerdas vocales. Los casos más serios pueden requerir cirugía para reposicionar las cuerdas vocales o crear una vía respiratoria alternativa si las cuerdas vocales obstaculizan la respiración.