




Mira el video

Tos ferina (Pertussis)



Descripción general

También conocida como tosferina o tos convulsiva, esta es una infección del revestimiento de sus vías respiratorias. Es altamente contagiosa. Es más común en niños pequeños que no han sido completamente vacunados y en personas que no han recibido las vacunas de refuerzo.

Causas

La tos ferina es producida por una bacteria llamada "Bordetella pertussis". Puede propagarse a través del aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Viaja en las gotitas de humedad que usted puede inhalar.

Síntomas

Los síntomas por lo general comienzan de siete a diez días después de haberse infectado. Comienza como un resfriado común, con secreción nasal, congestión, estornudos, tos leve y fiebre. Pero por lo general, al cabo de una o dos semanas, se comienza a tener ataques severos de tos. Usted tose una y otra vez. Es posible que al inhalar produzca un silbido característico. Es posible que tosa tanto como para vomitar. Sin embargo, no todos experimentan estos severos ataques de tos. Algunas personas desarrollan una tos más leve y persistente. Algunos bebés que tienen la infección no desarrollan tos en absoluto, pero es posible que les cueste respirar.

Prevención y tratamiento

La tos ferina se previene con una vacuna. Esta se aplica en una serie de inyecciones. Los médicos recomiendan que estas se inicien durante la infancia. Se recomiendan dosis de refuerzo a lo largo de la vida. Las personas que contraen la infección pueden ser tratadas con antibióticos. A menudo es necesario hospitalizar a los bebés. Su proveedor de salud puede crear un plan de cuidados que sea el adecuado para sus necesidades.