




Mira el video

## Oído de nadador (otitis externa)



### Descripción general

Esta es una inflamación, irritación o infección del oído. Puede afectar el conducto auditivo y la parte externa de su oído. El oído de nadador es más común en adolescentes y adultos jóvenes. Puede ser un problema de corto plazo, o algo que vuelve repetidamente.

### Causas

¿Qué causa el oído de nadador? Bueno, a menudo está relacionado con una infección bacteriana o fúngica. Los gérmenes pueden infectar su oído, si nada en aguas sucias. Puede contraer una infección si daña la piel de su oído de alguna manera. Rascarse la oreja, limpiarse la oreja con hisopos de algodón o que algo se quede atascado en el oído pueden provocar una infección. El oído de nadador también es causado por reacciones alérgicas y afecciones crónicas de la piel.

### Síntomas

Los síntomas incluyen enrojecimiento, dolor y picazón del conducto auditivo. Su oído puede secretar. La secreción puede ser espesa y similar al pus, con un color amarillo o verde. Puede oler mal. Y es posible que tenga dificultad para escuchar.

### Tratamiento

El oído de nadador se trata generalmente con gotas antibióticas. Es posible que también necesite otros medicamentos. Su proveedor de salud creará un plan de cuidados que sea adecuado para usted.