




Infección por tenia



Descripción general

Esta infección es causada por el parásito tenia. Cuando usted se infecta, una o más tenias viven y crecen dentro de usted. Pueden vivir en su intestino y migrar a otras partes de su cuerpo. Una tenia adulta puede vivir durante décadas en su intestino.

Causas

¿Cómo se produce la infección? Ocurre cuando usted come o bebe algo contaminado con huevos o larvas de tenia. Los huevos de tenia se propagan a través de las heces de un animal o un ser humano infectado. Los huevos contaminan fuentes cercanas de agua o alimentos. Usted puede ingerir larvas de tenia al comer carne poco cocida de un animal infectado.

Síntomas

¿Cuáles son los síntomas? Bueno, depende del tipo de infección que tenga. Si tiene una infección intestinal, es posible que no note ningún síntoma. O bien, puede tener náuseas, debilidad y mareos. Puede sufrir pérdida del apetito, y puede bajar de peso. Es posible que tenga dolor abdominal y diarrea. Y tal vez tenga deseos intensos de consumir sal. Si las larvas de tenia se diseminan a otras partes de su cuerpo, puede tener una gran variedad de problemas. Es posible que desarrolle quistes o bultos en sus órganos y tejidos. Es posible que tenga dolores de cabeza, convulsiones y otras complicaciones graves.

Tratamiento

El tratamiento depende de su infección. Una tenia en sus intestinos puede ser expulsada naturalmente, sin tratamiento. O puede que necesite medicamentos para eliminarla. Si la infección afecta a otros órganos, puede beneficiarse de una serie de otras opciones de tratamiento. Esto puede incluir la cirugía. Su médico creará un plan de cuidados que sea adecuado para usted.