




Mira el video

Síndrome del bebé sacudido



Descripción general

Esta lesión cerebral se produce cuando un bebé es sacudido violentamente. Los bebés no tienen músculos fuertes en sus cuellos. Sacudir al bebé hace que su cabeza se desplace fuertemente hacia adelante y hacia atrás. Su cerebro se golpea contra el interior de su cráneo. Esto puede producir hematomas y sangrado. Es posible que el cerebro se hinche.

Causas

¿Qué es lo que causa el síndrome del bebé sacudido? Por lo general, no es el juego común el que lo causa. Por ejemplo, hacer rebotar a un bebé en sus rodillas no es probable que lo cause. Lo causa el abuso. Sigue cuando un parent o una persona responsable del cuidado se cansa de escuchar al bebé llorar. Ellos sacuden al bebé violentamente, llevados por la ira.

Síntomas

¿Cuáles son los síntomas? Algunas veces, el bebé presenta moretones en la cara. Pero es posible que no se vea ninguna otra señal de lesión en su cuerpo. Es posible que el bebé esté inquieto y somnoliento, y es probable que tenga problemas para respirar. Es posible que no tenga ganas de comer. Es posible que vomite. Puede ser que la piel se le ponga pálida o azulada o que tenga convulsiones. Un bebé sacudido puede quedar paralizado y entrar en estado de coma. Incluso una sacudida breve puede causar daño permanente.

Tratamiento

El síndrome del bebé sacudido es una emergencia médica. Si su bebé ha sido sacudido, busque asistencia médica lo más pronto posible. Recibir atención inmediata podría salvar la vida de su bebé.