



Faringitis estreptocócica en niños



Descripción general

Esta es una infección bacteriana de la garganta. Se contagia fácilmente de persona a persona. Es más común en niños, pero los adultos pueden contraerla también.

Causas

¿Qué causa la faringitis estreptocócica? Es causada por la bacteria *Streptococcus pyogenes*. Se disemina en las gotitas que se expulsan cuando una persona infectada tose y estornuda. Su hijo inhala estas gotitas o las recoge al tocar una superficie contaminada. Luego, la bacteria del estreptococo ingresa por la boca, la nariz o los ojos de su hijo.

Síntomas

¿Cuáles son los síntomas? La faringitis estreptocócica causa dolor de garganta y dificultad para tragar. Los ganglios linfáticos de la parte delantera del cuello de su hijo pueden hincharse y doler. Es posible que las amígdalas de su hijo enrojezcan y se hinchen, y es posible que aparezcan rayas o puntos blancos sobre ellas. Puede ser que aparezcan pequeños puntos rojos en el paladar de su hijo. La faringitis estreptocócica también puede producir fiebre, dolor de cabeza y dolores en el cuerpo. Puede causar erupción, náuseas y vómitos.

Tratamiento

Tratamos la faringitis estreptocócica con antibióticos y con medicamentos para aliviar los síntomas. Su hijo debe descansar y beber abundante agua. Un humidificador puede ayudar también. Su médico creará un plan de cuidados que sea adecuado para usted.