



Mira el video

Infección del tracto urinario (ITU) en los niños



Descripción general

Esta es una infección de cualquier parte del aparato urinario. Ese es el sistema que recoge y elimina la orina del cuerpo.

Causas

¿Qué causa una ITU? Por lo general, ocurre cuando gérmenes ingresan en la uretra. La bacteria E. coli es una causa frecuente. Normalmente vive en el intestino grueso. Pero se propaga a través de las heces y puede entrar en la uretra. Las infecciones del tracto urinario son más frecuentes en las niñas. Eso se debe a que las niñas tienen una uretra más corta que los niños.

Síntomas (en bebés)

¿Cuáles son los síntomas? En los bebés, usted puede notar irritabilidad, llanto y fiebre. Su orina puede tener mal olor. Pueden tener vómitos o diarrea y es posible que coman poco.

Síntomas (en niños)

En los niños, una ITU puede hacer que su niño pierda el control de su vejiga. Tal vez necesite orinar repentinamente y con frecuencia. O, puede tener dificultad para orinar y puede ser que le resulte doloroso. Es posible que se vea sangre en la orina y esta puede tener mal olor. También puede tener dolor en la zona abdominal, en la espalda o en el costado. Puede presentar fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos. Y puede sentirse cansado.

Tratamiento

Entre las opciones de tratamiento se encuentran los antibióticos y los medicamentos para aliviar el dolor. Una almohadilla térmica puede ayudar. Además, los niños deben beber abundante agua. Su médico creará un plan de cuidados que sea adecuado para usted.