





Diverticulitis



Descripción general

Se trata de la inflamación de unos pequeños sacos protuberantes, llamados "divertículos". Estos se forman en los puntos débiles de la pared del intestino. Lo más común es que se encuentren en el intestino grueso. Cuando uno tiene estos sacos, decimos que tiene "diverticulosis". Cuando estos se irritan o se infectan, se produce una "diverticulitis".

Causas

¿Cuál es la causa de esta afección? Esto sucede cuando los divertículos sufren desgarros. Resultan dañados y los gérmenes los infectan. El riesgo de sufrir diverticulitis es mayor a medida que se envejece. Es mayor si la persona padece obesidad y no realiza suficiente ejercicio físico. Fumar aumenta el riesgo. El consumo de gran cantidad de proteínas animales y de poca fibra aumenta el riesgo. Asimismo, algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo.

Síntomas

¿Cuáles son los síntomas? Se puede tener un dolor constante. En muchos casos se siente en el lado izquierdo del abdomen. Este dolor se puede prolongar durante días. Se puede tener fiebre, náuseas y vómitos. Es posible que tenga estreñimiento. Y algunos sufren de diarrea.

Tratamiento

¿Cómo se trata? Para aquellos con síntomas leves, puede ser suficiente una dieta líquida durante unos días en casa. Los antibióticos también pueden ser útiles. En cambio, si los síntomas son graves, posiblemente deba recibir tratamiento en un hospital. Puede ser que precise una intervención quirúrgica. Su médico creará un plan de cuidados que sea adecuado para usted.