




## Convulsión febril



### Descripción general

Esto sucede cuando un niño pequeño con fiebre comienza a convulsionar. Puede asustar a los padres, pero por lo general no dañará al niño.

### Causas

¿Qué causa una convulsión febril? Es provocada por la fiebre. A menudo, la fiebre está vinculada a una infección. O bien, su hijo puede tener fiebre después de recibir una vacuna. La tendencia a tener estas convulsiones es hereditaria. Sin embargo, cualquier niño puede tener una convulsión febril.

### Síntomas

¿Cuales son los síntomas? Durante una convulsión, es posible que su hijo ponga los ojos en blanco. Sus brazos y piernas pueden ponerse rígidos. Los músculos de los lados del cuerpo pueden tensarse. Puede sacudirse y caerse. Puede llorar o quejarse, y puede morderse la lengua. Puede vomitar u orinarse. Además, puede dejar brevemente de respirar.

### Duración de una convulsión

Las convulsiones febriles generalmente duran no más de diez segundos, pero pueden ser más prolongadas. A veces duran varios minutos. Cuando termina una convulsión, el niño puede parecer cansado o confundido.

### Durante una convulsión

¿Qué debería hacer durante una convulsión? Acueste a su hijo de costado sobre una superficie blanda, de donde no se caiga. Aleje los objetos que puedan causarle daño. Aflójele la ropa ajustada. No trate de evitar que se sacuda y no le ponga nada en la boca. Y comience a medir el tiempo de duración de la convulsión para tener esa información para el médico.

### Después de una convulsión

Cuando la convulsión termine, llame al médico de su hijo de inmediato. En caso de una convulsión que dure más de cinco minutos, llame para pedir ayuda de emergencia.