





Mira el video

Cierre esclerótico



Descripción general

Esta cirugía estabiliza una retina que se ha desprendido. Utiliza una banda para mantener la retina en su lugar.

Preparación

Para comenzar, se le administra un medicamento para adormecerlo y relajarlo. Se le puede administrar anestesia general. Es posible que le dilaten el ojo con gotas oculares.

Tratamiento de la retina

A continuación, el cirujano revisa su retina. Si usted tiene un agujero o desprendimiento en su retina, su cirujano puede sellarla. A menudo, esto se hace con una sonda especial que utiliza frío intenso para congelar el área dañada.

Aseguramiento del cerclaje escleral

Luego se asegura una pequeña banda llamada "cerclaje escleral", a la parte exterior del globo ocular. Es posible que se le coloque solo en una parte de su globo ocular. O puede ser que lo rodee totalmente. La banda empuja ligeramente hacia adentro. Mantiene unidas las capas del ojo, de modo que la retina pueda volver a unirse. Evitará que el humor vítreo tire de su retina. El cerclaje quedará en el lugar en forma permanente.

Fin del procedimiento

Cuando la cirugía esté terminada, se cubrirá su ojo con un parche. Se le mantiene bajo observación en una sala de recuperación. Siga las instrucciones de su médico mientras se recupera.